

Tableau 3. Analyse de la variance des données obtenues pour 12 géotypes de vigne cultivés à Frelighsburg et dans deux vignobles commerciaux (L'Orpailleur, à Dunham, et Dietrich-Jooss, à Iberville) au cours des saisons 2000 et 2001.

Sources de variation	Cultivar (C)			Traitement (M)		C x M	
	Année	F	Pr > F	F	Pr > F	F	Pr > F
Frelighsburg							
Rendement	2000	45,36	<0,0001	2,22	0,0893	2,78	0,0002
	2001	21,58	<0,0001	57,13	<0,0001	2,95	<0,0001
Poids des grains	2000	166,5	<0,0001	2,53	0,0599	1,41	0,1227
	2001	98,94	<0,0001	6,44	<0,0023	1,57	0,0697
Poids des grappes	2000	32,49	<0,0001	0,60	0,6155	0,48	0,9765
	2001	34,34	<0,0001	0,62	0,6018	0,63	0,8933
Mortalité	2000	29,29	<0,0001	8,86	<0,0001	1,15	0,2940
	2001	21,29	<0,0001	17,91	<0,0001	1,78	0,0182
Vigueur	2000	34,10	<0,0001	1,94	0,1225	262	0,0001
	2001	28,61	<0,0001	29,23	<0,0001	2,60	0,0001
L'Orpailleur							
Rendement	2000	10,06	<0,0001	20,68	<0,0001	3,47	<0,0001
	2001	14,53	<0,0001	43,91	<0,0001	1,93	0,0127
Mortalité	2000	15,11	<0,0001	53,51	<0,0001	3,27	<0,0001
	2001	29,22	<0,0001	93,44	<0,0001	7,06	<0,0001
Vigueur	2000	13,87	<0,0001	5,45	0,0011	2,18	0,0017
	2001	16,82	<0,0001	25,04	<0,0001	2,15	0,0019
Dietrich-Jooss							
Rendement	2000	5,75	<0,0001	6,19	0,0006	1,13	0,3210
Mortalité	2000	2,86	<0,0001	12,15	<0,0001	1,05	0,3983
Vigueur	2000	6,39	<0,0001	2,50	0,0591	1,56	0,0521