

Tableau 8. Contrastes orthogonaux permettant de comparer des groupes de génotypes soumis au traitement M3 (vigne abritée sous une toile géotextile) de protection hivernale.

		Contraste orthogonal (valeur de F)					
Coefficient de contraste		Rustique par rapport à semi-rustique			Rustique et semi-rustique par rapport à sensible		
Variable dépendante	Année	Freelightsburg	L'Orpailleur	Dietrich-Jooss	Freelightsburg	L'Orpailleur	Dietrich-Jooss
Rendement	2000	3,55 NS	13,86 ***	6,93 **	26,72 ***	7,48 **	0,72 NS
	2001	0,75 NS	0,51 NS	-	8,94 **	0,15 NS	-
Mortalité	2000	1,86 NS	5,94 **	0,38 NS	79,73 ***	181,3 ***	7,35 **
	2001	0,03 NS	0,78 NS	-	83,95 ***	166,7 ***	-
Vigueur	2000	6,06 **	1,35 NS	0,40 NS	184,0 ***	108,7 ***	30,36 ***
	2001	6,49 **	1,41 NS	-	157,3 ***	198,6 ***	-

Groupes de variétés : R par rapport à S-R, R et S-R par rapport à S; Rusticité : R= rustique, S-R= semi-rustique, S= sensible

NS : non significatif; * : significatif à P < 0,05; ** : significatif à P < 0,01; *** : significatif à P < 0,001.